

Växtskyddsbrev

2010-07-09

Nr 13. Kronrost i havre – kontrollera havrefälten i områden där kronrosten brukar uppträda

Kronrosten, som angriper havre, värdväxlar med getapel eller vägtorn, som den också kallas. I områden där getapel finns, förekommer också ofta angrepp av kronrost i havren. Det mest kända området i Kalmar län, där kronrost uppträder, är Emmådalen, men sjukdomen kan uppträda även på andra platser.

Ännu har ingen kronrost rapporterats från vårt område men angrepp rapporteras från andra delar av Sverige. Kontrollera därför havrefälten i områden där kronrost brukar förekomma. Tänk speciellt på att titta i sent utvecklade fält. Havrefälten är nu i allmänhet i DC 59-61, vippgång till begynnande blomning. Begynnande angrepp syns som orangegula sporsamlingar, 2-5 mm stora, på bladen (se bild).

Bekämpningströskel: Begynnande angrepp.

Bekämpningstidpunkt: Från DC 55 fram till DC 71 (halva vippan framme till begynnande mjölkmodnad, kärnan fortfarande grön, innehållet tunnflytande och klart).

Preparat: Comet 0,3-0,5 l/ha i första hand. Även Jenton 0,6-0,8 l/ha och Tilt Top 0,4-0,6 l/ha kan användas. Observera att Tilt Top får användas senast i DC 59, full vippgång, och Jenton senast i DC 69, avslutad blomning. Comet -preparat kan försena mognaden och bör därför användas i låg dos vid sena utvecklingsstadier.



Kronrost i havre.

Gunnel Andersson